

24 DE MARZO

DÍA MUNDIAL DE LA TUBERCULOSIS

- Es una infección producida por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones.
- Se puede prevenir y tiene cura.
- Se transmite entre personas a través del aire.



Incidencia en la población mundial



¿Quiénes presentan mayor riesgo?



Afecta principalmente a los adultos en edad productiva.


Las personas infectadas por el VIH tienen entre 20 y 30 veces más probabilidad de desarrollar tuberculosis activa.



El consumo de tabaco aumenta considerablemente el riesgo. Más del 20% de los casos de tuberculosis se asocia con el tabaquismo.



El riesgo también es elevado en personas con trastornos en el sistema inmunitario.



480.000

personas desarrollaron en 2015 tuberculosis multirresistente en todo el mundo.

Alto a la Tuberculosis - OMS

Pilar 1: atención y prevención integradas y centradas en el paciente.

Pilar 2: intensificación de la investigación y la innovación.

Pilar 3: políticas audaces y sistemas de apoyo.



META:

Reducir las muertes por tuberculosis en un 90% y los nuevos casos en un 80% entre 2015 y 2030.

Tratamiento

La forma activa sensible a los antibióticos, se trata con una combinación estándar de 4 medicamentos

Son cruciales las tareas de información, supervisión y atención al paciente

De 2000 a 2015 se salvaron **49 millones de vidas** gracias al diagnóstico y tratamiento.

La tasa de éxito del tratamiento de la tuberculosis fue del **83%** en 2014.

Recomendaciones SEIMC

- La tuberculosis es una enfermedad curable que puede afectar a cualquier persona. En ningún caso debe ser considerada un estigma social o cultural.
- La mejor prevención de la tuberculosis es el diagnóstico precoz y el tratamiento correcto de los pacientes con enfermedad activa.
- El manejo de la tuberculosis es multidisciplinar: junto al adecuado soporte clínico y microbiológico, se requiere la intervención de trabajadores sociales y el apoyo de agentes comunitarios de salud.
- Es fundamental proveer y garantizar los recursos necesarios para mejorar el conocimiento de la enfermedad mediante la investigación.
- Es imprescindible promover la coordinación de todas las instituciones y dispositivos implicados en el control de la tuberculosis y asegurar la calidad de los métodos diagnósticos y terapéuticos mediante un Plan Nacional.